



Fórmula Médica

manipulando desde 1989

MOVE

ANTIINFLAMATÓRIO 100% NATURAL

Move é um anti-inflamatório natural e patenteado que diminui comprovadamente a inflamação nas articulações, de forma segura, sem causar os efeitos colaterais relacionados aos anti-inflamatórios comuns. Estudos comprovam melhora significativa da dor articular em 7 dias.

O ativo se diferencia pela sua composição enriquecida com 20% de AKBA (*Acetyl11-keto-β-boswellic acid*) e óleos não voláteis de *Boswellia serrata* extraídos por um processo patenteado e especial o que o torna comprovadamente mais biodisponível e conseqüentemente mais eficaz que extratos simples contendo AKBA.

VANTAGENS

CONTROLA A INFLAMAÇÃO SEM CAUSAR OS EFEITOS COLATERAIS DA MAIORIA DOS ANTI-INFLAMATÓRIOS

REDUZ A DOR E O DESCONFORTO ARTICULAR, COM RESULTADOS VISÍVEIS EM 7 DIAS

RESULTADOS COMPARÁVEIS À AÇÃO DA PREDNISOLONA NA REDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO E DO EDEMA

NÃO AGE ATRAVÉS DA INIBIÇÃO DA COX

DOSE INDICADA

Até 100mg /dia, podendo ser dividido em até duas tomadas.

MECANISMO DE AÇÃO

Move reduz a inflamação presente na osteoartrite (OA) atuando em mais de uma via, além de auxiliar na diminuição da degradação da cartilagem.

1º VIA

Inibe a 5-lipoxigenase (Enzima envolvida diretamente na produção de mediadores inflamatórios).

Inibe a produção dos Leucotrienos (Mediadores pró-inflamatórios envolvidos na inflamação).

Controla a inflamação, diminuindo seus sintomas.

2º VIA

Inibe TNF-α (Citocina pró-inflamatória presente na OA, responsável pelo aumento da inflamação e da produção de MMP-3).



Controla a inflamação e diminui a produção de MMP-3.

Diminui a degradação do colágeno.

RESULTADOS CLÍNICOS


COMPARATIVO DE EFICÁCIA E TOLERABILIDADE DE 5-LOXIN E MOVE NA OSTEOARTRITE DE JOELHO:

Estudo clínico randomizado, duplo cego e placebo controlado.




* 5-Loxin é um extrato padronizado contendo 30% de AKBA. Move é uma evolução de 5-Loxin, de composição patenteada, padronizada e completamente biodisponível.

EFICÁCIA ANTI-INFLAMATÓRIA DE MOVE COMPARADA À PREDNISOLONA



Diminuição do edema de pata em ratos com Move. Resultados compatíveis com Prednisolona.



Redução de 65,04% na concentração de TNFα com uso de Move x 77,67% de redução com uso de Prednisolona.



Av. Moema, 678 | Moema |
formulamedica@uol.com.br

11 5055-7380
11 99626-5500

SIGA-NOS
Instagram | Facebook

www.formulamedica.com.br